

## De otras revistas – marzo 2025

[About other journals - March 2025]

Aida Luis

Hospital del Niño, Panamá, Panamá.

**Correspondencia:** Dra. Aida Luis / **Email:** aidaluis@gmail.com

**Revista:** Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

**Título original:** Pensamientos y conductas suicidas en preadolescentes: un estudio longitudinal intensivo de los factores de riesgo.

**Autores y como citar:** Thompson, Renée J et al. Preadolescent Suicidal Thoughts and Behaviors: An Intensive Longitudinal Study of Risk Factors.

**Disponible en:**  
10.1016/j.jaac.2024.03.018

**Publicado:** 30 de abril de 2025

**Palabras clave:** conductas suicida, ventilación no-invasiva, hábitos de juego

**Keywords:** suicidal behaviors, non-invasive ventilation, gambling habits

**Reproducción:** Para uso personal e individual. Sujeto a derechos de reproducción.

**DOI:**  
10.37980/im.journal.rspp.20252555

**Disponible en:**

LatinIndex

LILACS

Revistas Médicas

## Resumen

**Objetivo:** El drástico aumento en las tasas de pensamientos y conductas suicidas (PCSs) entre los jóvenes pone de relieve la necesidad de identificar con precisión los factores de riesgo tempranos. Este estudio empleó un muestreo longitudinal intensivo para evaluar las asociaciones concurrentes entre los factores de riesgo y la presencia de PCS, la relación entre los cambios proximales en los factores de riesgo y la presencia de PCS, y la predicción prospectiva de los factores de riesgo sobre la presencia de PCS en una muestra de preadolescentes enriquecida con psicopatología infantil temprana.

**Método:** Se incluyeron 192 participantes del Estudio de Terapia de Interacción Padre-Hijo-Desarrollo Emocional (PCIT-ED, siglas del estudio en inglés), un estudio longitudinal de niños con y sin depresión preescolar. Los participantes de 7 a 12 años completaron una entrevista diagnóstica, seguida de 12 meses de muestreo longitudinal intensivo, en el que se evaluaron las experiencias de ideación suicida y 11 variables psicosociales con vínculos conocidos con los PCSs en adolescentes y adultos. Los preadolescentes con antecedentes de PCS (alto riesgo) recibieron encuestas semanales, y aquellos sin antecedentes de PCS (bajo riesgo) recibieron encuestas mensuales.

**Resultados:** El sexo femenino, los síntomas depresivos elevados, un mayor uso de la supresión expresiva y la rumiación, la claridad emocional y la percepción de carga se asociaron simultáneamente de forma única con la probabilidad de PCS. Dentro del grupo de alto riesgo, (1) los aumentos en la depresión, la supresión expresiva, la rumiación y la percepción de carga, y las disminuciones en el afecto positivo de la semana  $t$  a la semana  $t + 1$  se asociaron con una mayor probabilidad de un estado PCS positivo en la semana  $t + 1$ ; y (2) una mayor supresión expresiva, percepción de carga y críticas y conflictos por parte del cuidador en la semana  $t$  en comparación con los niveles medios de los participantes predijeron prospectivamente, aumentos en la probabilidad de un informe positivo de PCS de la semana  $t$  a la semana  $t + 1$ .

**Conclusión:** Los factores psicosociales que influyen en los PCSs en adolescentes y adultos también afectan a los preadolescentes en su vida cotidiana. La supresión expresiva y la percepción de carga se han identificado sistemáticamente como nuevos indicadores de riesgo y posibles objetivos de tratamiento. Además, el aumento de la depresión, la rumiación, las críticas y los conflictos de los cuidadores, así como la disminución del afecto positivo, podrían impulsar un mayor cribado y evaluación de los PCS en preadolescentes con antecedentes de PCSs.

**Resumen en lenguaje sencillo:** Se han observado grandes aumentos en las tasas de pensamientos y comportamientos suicidas (PCSs) entre los jóvenes, lo que resalta la necesidad de identificar tempranamente los factores de riesgo en los preadolescentes. Durante un año, 192 niños de siete a doce años del Medio Oeste, algunos de los cuales tenían antecedentes de PCSs, informaron repetidamente sobre varios factores de riesgo y la aparición de PCSs durante la semana o el mes anterior. Reprimir las emociones y sentirse como

una carga emergieron como factores de riesgo y predijeron una mayor probabilidad de aparición de PCSs, lo que sugiere que estos podrían ser objetivos potenciales para el tratamiento. Los hallazgos también sugieren que el aumento en la depresión, la rumiación, la crítica y el conflicto de los cuidadores, así como la disminución de las emociones positivas, deberían motivar la detección y evaluación de PCS para los preadolescentes con antecedentes de PCSs.

**Declaración de Diversidad e Inclusión:** Nos esforzamos por garantizar la diversidad racial, étnica y/o de otro tipo en el reclutamiento de participantes humanos. Nos aseguramos de que los cuestionarios del estudio se prepararan de forma inclusiva. Uno o más de los autores de este artículo se identifican como miembros de uno o más grupos raciales y/o étnicos históricamente subrepresentados en la ciencia. Uno o más de los autores de este artículo se identifican como miembros de uno o más grupos sexuales y/o de género históricamente subrepresentados en la ciencia. Si bien citamos referencias científicamente relevantes para este trabajo, también trabajamos activamente para promover el equilibrio de sexo y género en nuestra lista de referencias.

**Revista:** Anales de Pediatría

**Título original:** Ventilación no invasiva en la estabilización de pacientes con bronquiolitis aguda durante el transporte inter-hospitalario.

**Autores y como citar:** Rodríguez-Tubío S, Morey-Olivé M, Romero-Carmona M, et al. Anales de Pediatría. Vol. 102, n. 2, 2025.

**Disponible en:**  
10.1016/j.anpedi.2024.503744

## Resumen

**Objetivo:** Describir y comparar las características de los pacientes con bronquiolitis aguda (BA) trasladados entre hospitales con ventilación no invasiva (VNI), iniciada bien por el equipo de transporte pediátrico (ETP) o por el hospital emisor (HE).

**Métodos:** Estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico realizado por un ETP. Se incluyeron todos los pacientes con BA trasladados con VNI entre dos hospitales entre enero de 2021 y marzo de 2024.

**Resultados:** Se incluyeron en el estudio 263 pacientes trasladados con VNI; en 119 (45,2%) el soporte fue iniciado por el HE y en 144 (54,8%), por el ETP. El inicio de VNI por el HE se asoció a un menor tiempo de estabilización, mediana de 40 minutos, rango intercuartílico (RIQ) de 33,3-47 minutos, en comparación con los del grupo ETP, con 47 (RIQ: 40-56) minutos. Se objetivó una menor puntuación en la escala de gravedad BROSJOD y de las necesidades de oxígeno en el grupo de pacientes de VNI en HE tanto al inicio como al final del traslado. Se registraron incidencias en un 14,1% (37) de los traslados, que fueron más frecuentes en el grupo de HE, siendo en su mayoría fugas y desadaptación.

**Conclusiones:** Los pacientes con BA que precisaron traslado con VNI se beneficiaron de un inicio precoz del soporte, trasladándose en mejores condiciones clínicas. Formar al personal de los HE en el uso de la VNI podría disminuir las complicaciones relacionadas con su uso.

**Revista:** Acta Paediatrica

**Título original:** Jugar al aire libre durante la edad preescolar se asoció con un menor riesgo de obesidad en edad escolar en Japón.

**Autores y como citar:** Takashiro Tsuge, Naomi Matsumoto, et al. Outdoor playing during preschool was associated with a reduced risk of school-age obesity in Japan. Acta Paediatrica/ Volume 114, Issue 2/ p. 303 – 309.

**Disponible en:**  
<https://doi.org/10.1111/apa.17441>

## Resumen

**Objetivo:** Este estudio investigó la asociación entre los hábitos de juego al aire libre durante la etapa preescolar y la obesidad en la edad escolar.

**Métodos:** Realizamos un estudio de cohorte longitudinal de todos los niños nacidos en Japón durante dos semanas entre enero y julio de 2001. Definimos los hábitos de juego al aire libre a los 2,5 años (tercera encuesta) como exposición, mientras que la altura y el peso informados por los padres a los 7 años (séptima encuesta) se definieron como sobrepeso y obesidad según la referencia de la OMS. Se utilizaron modelos de regresión logística para estimar las razones de probabilidades (OR) de las asociaciones entre los hábitos de juego al aire libre en edad preescolar y la obesidad en edad escolar, ajustando los factores parentales e infantiles.

**Resultados.** De 53 575 niños nacidos, 42 812 tenían datos sobre sus hábitos de juego al aire libre a los 2,5 años, y el 91 % (38 970) tenían dichos hábitos. A los 7 años, 31 743/42 812 (74 %) niños tenían datos de altura y peso, y 3249/31 743 (10 %) se clasificaron con sobrepeso u obesidad (puntuación DE del IMC  $\geq 1,0$ ). Los hábitos de juego al aire libre se asociaron negativamente con la obesidad (OR ajustada: 0,85; intervalo de confianza (IC) del 95 %: 0,74-0,97).

**Conclusión:** Los hábitos de juego al aire libre en los primeros años preescolares se asocian con un menor riesgo de obesidad escolar. Los padres y cuidadores pueden considerar fomentar en sus hijos hábitos de juego al aire libre desde una edad temprana para ayudar a prevenir la obesidad en etapas posteriores de la vida.

Fuente: Acta Paediatrica